

W drugiej połowie lipca spodziewane jest drugie kwitnienie traw - stężenie ich pyłku może kilkakrotnie przekroczyć wartości bardzo wysokie. Także wtedy ponownie wzrośnie stężenie pyłku babki, której pyłek zaliczany jest do grupy o dużym zagrożeniu klinicznym. W powietrzu unosił się będzie także pyłek bylicy z grupy o bardzo dużym zagrożeniu klinicznym oraz komosy, z grupy o dużym zagrożeniu. Jednak w Rabce i okolicy pyłek tych roślin nie powinien przekroczyć wartości średnich.

W sierpniu dobiega końca okres pylenia roślin o klinicznym znaczeniu dla osób alergicznych. Z grupy o bardzo dużym i dużym zagrożeniu klinicznym pylić jeszcze będą babka, bylica i komosa, lecz stężenie pyłku tych roślin w okolicach Rabki raczej nie przekracza wartości średnich. Natomiast stężenie pyłku pokrzywy, należącej do grupy o średnim zagrożeniu klinicznym, w pierwszej połowie miesiąca może przekraczać wartości bardzo wysokie. Dużej aktywności należy spodziewać się ze strony pleśni: stężenie zarodników *cladosporium* na pewno przekraczać będzie wartości bardzo wysokie, *penicilium* wysokie, a zarodniki *alternarii* wartości średnie.